



PfizerInnovations AB

191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se

Version: 06. Senast granskat av Läkemedelsverket:
11 februari 2020

- Har varit i nära kontakt med en person som har tuberkulos.
- Upptäcker några nyttillkomna hudförändringar eller förändringar i befintliga hudfläckar eller prickar.
- Får symtom på interstitiell lungsjukdom, till exempel svårt att andas.
- Får symtom från buken som t.ex. ont i magen/buken, blod i avföringen, eller förändrade avföringsvanor samt feber.
- Får gulfärgad hud, illamående eller kräkningar.
- Ska vaccineras. Det finns vissa vacciner som du inte ska få medan du tar XELJANZ.

- Blir gravid eller planerar att bli gravid. XELJANZ ska inte användas under graviditet. Fertila kvinnor ska använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med XELJANZ och i minst 4 veckor efter den sista dosen.
- Kvinnor ska inte amma under behandling med XELJANZ.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar i samband med XELJANZ-behandlingen ber vi dig tala med läkare eller apotekspersonal, eller rapportera dessa omgående till:

Läkemedelsverket

Box 26

75103 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Version: 06

Senast granskat av Läkemedelsverket: 11 februari 2020

Övrig information (fylls i nedan)

Patientens namn: _____

Läkarens namn: _____

Läkarens tel.nr: _____

Läkarens fax.nr: _____

Om du slutar ta XELJANZ ska du ha med dig detta kort i minst 2 månader efter den sista dosen XELJANZ.

PATIENTKORT

XELJANZ®
(tofacitinib)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Version: 06

Senast granskat av Läkemedelsverket: 11 februari 2020

- Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till innan du börjar ta XELJANZ och under tiden du behandlas med XELJANZ. Be läkaren/apotekspersonalen förklara sådant i denna information som du inte förstår.
- Ha alltid detta kort med dig och visa upp det för alla läkare och all apotekspersonal som på något sätt medverkar i din vård.
- Mer information finns i bipacksedeln till XELJANZ. Använd XELJANZ på det sätt som beskrivs i bipacksedeln.

Informera läkaren eller apotekspersonalen om ALLA läkemedel du tar, både receptbelagda och receptfria, och även vitaminer och naturläkemedel.

Vissa läkemedel avlägsnas ur kroppen via samma vägar som XELJANZ. Om de tas tillsammans med XELJANZ kan de förändra mängden XELJANZ i kroppen och dosen XELJANZ kan behöva ändras. Du ska tala om för din läkare om du använder läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

- Antibiotika, exempelvis rifampicin, som används för att behandla bakteriella infektioner
- flukonazol och ketokonazol som används för att behandla svampinfektioner

XELJANZ kan användas i kombination med metotrexat eller ibland ensamt. Generellt sågs färre biverkningar när XELJANZ användes ensamt.

XELJANZ rekommenderas inte tillsammans med biologiska DMARD mot reumatoid artrit eller psoriasis artrit, biologiska läkemedel för ulcerös kolit eller vissa andra läkemedel som sätter ner immunförsvaret (t.ex. azatioprin, merkaptopurin, takrolimus eller ciklosporin). Om du tar XELJANZ samtidigt med dessa läkemedel kan risken för att immunförsvaret hämmas och att drabbas av infektioner öka.

XELJANZ kan öka risken att få en infektion, som om den inte behandlas kan bli allvarig. Du kan löpa en högre risk för

infektioner om du är 65 år eller äldre, har diabetes, kronisk lungsjukdom eller tar kortikosteroider. Läkaren avbryter eventuellt din behandling med XELJANZ.

Behandling med XELJANZ kan öka risken för icke-melanom hudcancer.

Under behandling med XELJANZ

Tala **omedelbart** om för din läkare om du:

- Får plötslig andfåddhet eller andningssvårighet, bröstsmärta eller smärta i övre delen av ryggen, svullnad av ben eller armar, smärta eller ömhet i benen eller rodnad eller missfärgning av benet eller armen medan du tar XELJANZ eftersom dessa kan vara tecken på en propp i lunga eller ven.
- Får symtom på en infektion, t.ex. feber, ihållande hosta, vikt-nedgång eller kraftig trötthet.
- Får symtom på herpes zoster, till exempel smärtsamma hudutslag eller blåsor.